

PSYCHIATRIE D'ENFANTS ET D'ADOLESCENTS



Cliniques de psychiatrie d'enfants et d'adolescents

PSYCHIATRIE POUR ADULTES



LES PATIENTES ET PATIENTS

Nombre de patient-e-s:
4'950

Âge: Ø **14.9 ans**



Nombre de cliniques:
30

Durée de séjour
moyenne:

32.6 jours

Diagnosics
principaux les
plus fréquents:



42.44%
Troubles affectifs,
p.ex. dépressions



16.77%
Anxiété, compulsions,
stress



15.27%
Troubles du
comportement, troubles
émotionnels

Admission

Psychiatrie stationnaire

Sortie

OBJECTIF: réduire l'importance
d'un trouble psychique

Résultats de
mesure détaillés:



www.anq.ch

RÉSULTATS DE MESURE 2022

Importance des symptômes

La mesure de l'importance
des symptômes comprend:



Troubles psychiques
p.ex. dépressions, anxiété et
compulsions, schizophrénie, trouble
de stress, trouble alimentaire



Limitations physiques
p.ex. dépendance, somatisation



Limitations fonctionnelles sociales
p.ex. relations, activités, logement,
profession/école et vie quotidienne

Evaluation par des tiers:

19.02 Pt.

13.28 Pt.

(importance moyenne
sur une échelle 0-52)

Autoévaluation:

22.71 Pt.

16.10 Pt.

(importance moyenne
sur une échelle 0-52)

Toutes les cliniques présentent une réduction de l'importance des symptômes entre l'admission et la sortie tant du point de vue du personnel soignant (évaluation par des tiers) que de celui des patientes/patients (autoévaluation).

Sont concernés par au moins une
mesure limitative de liberté:

5.80%



de toutes les cliniques de psychiatrie
d'enfants et d'adolescents

Mesures limitatives de liberté



Uniquement en cas de risque de mise en danger de soi et d'autrui

Les Mesures limitatives de liberté incluent:
isolement, immobilisation, médication forcée

Satisfaction des patients: les résultats de cette mesure séparée sont publiés sur le portail web de l'ANQ sous www.anq.ch.